



SYRACUSE ENDOSCOPY ASSOCIATES, LLC

5000 CAMPUSWOOD DRIVE #100, EAST SYRACUSE, NY 13057

WWW.SYRACUSEGASTRO.COM

(315) 234-6677

SIGMOIDOSCOPIA (FLEX SIG) INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

(IMPORTANTE: Asegúrese de leer también el reverso de este documento).

- Ocho (8) horas antes de su hora de llegada: NO caldo. NO alimentos sólidos. NO leche ni productos lácteos. NO usar colorantes rojos ni morados. NO usar café. NO usar bebidas alcohólicas ni cerveza. Puede continuar con los líquidos claros durante cuatro (4) horas más. Ejemplos de líquidos claros: agua, jugos de frutas claros (manzana, uva blanca, arándano blanco), Jell-O (sin rojo ni morado), ginger ale, Gatorade (sin rojo ni morado), Kool-Aid (sin rojo ni morado), Seven-Up, paletas heladas (sin rojo ni morado), té (sin leche).
- Cuatro (4) horas antes de su hora de llegada: Suspenda todos los líquidos claros. No mastique chicle, no use caramelos duros y No masticar tabaco.
- Tome sus medicamentos con un sorbo de agua, al menos dos horas antes de su hora de llegada.
- Tome todos los medicamentos para el corazón o la presión arterial la mañana del examen, con un sorbo de agua. • **EL DÍA DE SU EXAMEN:** Deberá usar dos (2) enemas Fleet para limpiar la parte inferior intestino.
- DOS (2) HORAS ANTES DE SU HORA DE LLEGADA: UTILICE EL PRIMER ENEMA.
- 30 MINUTOS ANTES DE SALIR A SU CITA: UTILICE EL SEGUNDO ENEMA.
- Traiga consigo: lista de medicamentos vigente, identificación con foto, tarjetas del seguro médico y el cuestionario. • No podrá conducir después del procedimiento ni durante el resto del día. Por favor, pida a un adulto responsable que lo lleve a casa. Si necesita usar un taxi o Uber, DEBE ir acompañado de un adulto responsable, como un familiar o un amigo, en el viaje de regreso.
- Si su cita es a las 2:00 p. m. o más tarde, es necesario que su conductor permanezca en la sala de espera durante su procedimiento. No se pueden usar taxis ni Ubers para estas citas tardías. • Si toma anticoagulantes (aspirina, Coumadin, Plavix, etc.), por favor, infórmenos. Se comunicará con el médico que le recetó el medicamento para obtener instrucciones específicas. • Si tiene un marcapasos o un desfibrilador, asegúrese de que el consultorio lo sepa. • Si tuvo COVID en el mes anterior a su procedimiento, llame a la oficina.
- Llame a la oficina si ha tenido nuevos síntomas, diagnósticos, medicamentos, cirugías u hospitalizaciones desde la última vez que hablamos con usted.

Fecha de cita: _____

Hora de llegada: _____

Tiempo de procedimiento _____

Por favor presentarse a: Syracuse
Endoscopy Associates ¡NUEVA UBICACIÓN!

5000 Campuswood Drive #100 Este de
Syracuse, NY 13057

UNA SEMANA ANTES de su cita,
recibirá una llamada telefónica de la sala
de endoscopia.
DEBE HABLAR CON ELLOS o su
procedimiento podría ser cancelado.
El número de Jennifer es 234-6679

Diabético CON INSULINA	Y N
SARM o ERV: ¿quién lo diagnosticó y cuándo?	Y N
Se ordenó la prueba C-DIFF	Y N
Marcapasos/Desfibrilador - copia tarjeta marcapasos, ¿quién es el cardiólogo?	Y N
Anticoagulantes: ¿nombre y quién los prescribe el médico?	Y N
¿Trastorno de la coagulación?	Y N
¿Necesita traductor?	Y N
¿Oxígeno? ¿Cuántos litros?	Y N
Hipertermia severa	Y N
En diálisis (debe ser RCC)	Y N
Tuvo COVID el mes pasado	Y N
El paciente tiene medicamentos para mantener	Y N

VER EL REVERSO PARA MÁS INSTRUCCIONES

AGOSTO DE 2025

Para asegurarse de que esté disponible, vaya a su farmacia al menos 5 días antes de su cita y compre Fleet Enemas.

Medicamentos que deben suspenderse antes del procedimiento:

NO TOMAR 7 DÍAS ANTES:

Fentermina (Adipex-P, Suprenza)
Fentermina/Topiramato (Qsymia)
Orlistat (Xenical, Alli)
Lorcaserina (Belviq)
Dietilpropión
Metanfetamina (Desoxyn)
Liraglutida (Saxenda)
Benzfetamina (Didrex, Regimex)
Fendimetrazina (Bontril PDM)
Carafate
Hierro
Multivitaminas
Medicamentos a base de hierbas
aceite de pescado
Vitaminas A y E

NO TOMAR 2 DÍAS ANTES:

Lisdexanfetamina (Vyvanse)
Dextroanfetamina y anfetamina (Adderall)
Cualquier medicamento para el TDAH
Sildenafil (Viagra)
Cialis

No se permite marihuana ni drogas recreativas



Si usted es un paciente diabético, llame al médico que controla su diabetes y hágale saber que se estará preparando para una colonoscopia.

Infórmeles sobre los cambios de medicación que necesita realizar y trabaje con su médico sobre cómo controlar su nivel de azúcar en sangre durante el período de preparación.

MEDICAMENTOS PARA LA DIABÉTICA Y LA PÉRDIDA DE PESO

Los siguientes medicamentos **DEBEN SUSPENDERSE** según las instrucciones a continuación

MEDICAMENTOS GLP-1

Si toma un medicamento GLP-1 DIARIAMENTE, deberá omitir la dosis del día del procedimiento. Si toma un medicamento GLP-1 SEMANALMENTE, deberá omitir la dosis de la semana anterior al procedimiento.

Trulicity (dulaglutida)
Bydureon BCise o Byetta (Exenatida)
Ozempic, Wegovy o Rybelsus (semaglutida)
Saxenda o Victoza (Liraglutida)
Adlyxin o Lyxumia (Lixisenatida)
Mounjaro o Zepbound (Tirzepatide)
Soliqua (insulina glargina/lixisenatida)
Beinaglutida
PEG-loxenatida

MEDICAMENTOS SGLT2

• Suspenda estos medicamentos durante 3 días.

Jardiance (Empagliflozina)
Brenzavvy (bexagliflozina)
Invokana (Canagliflozina)
Farxiga o Xigduo (dapagliflozina)
Inpefa (sotagliflozina)
Suglat (ipragliflozina)
Invokamet (Canagliflozina más metformina HCl)
Synjardy (Empagliflozina más metformina HCl)
Qtern (dapagliflozina y saxagliptina)

Steglatro (Ertugliflozina) • Suspenda este medicamento durante 4 días