



# SYRACUSE ENDOSCOPY ASSOCIATES, LLC

5000 CAMPUSWOOD DRIVE #100, EAST SYRACUSE, NY 13057

WWW.SYRACUSEGASTRO.COM

(315) 234-6677

## INSTRUCCIONES PARA LA PANENDOSCOPIA

(IMPORTANTE: Asegúrese de leer también el reverso de este documento).

Ocho (8) horas antes de su llegada: **NO caldo. NO alimentos sólidos.** NO leche ni productos lácteos. NO colorantes rojos ni morados. NO café. NO bebidas alcohólicas ni cerveza. Puede continuar con los líquidos claros durante cuatro (4) horas más. Ejemplos de líquidos claros: Agua, jugos de frutas claros (manzana, uva blanca, arándano blanco), Jell-O (no rojos ni morados), ginger ale, Gatorade (no rojos ni morados), Kool-Aid (no rojos ni morados), Seven-Up, paletas heladas (no rojas ni moradas), té (no leche).

• Cuatro (4) horas antes de su hora de llegada: **Suspenda todos** los líquidos claros. No mastique chicle ni bebidas duras. dulces y nada de tabaco para masticar.

• Tome sus medicamentos con un sorbo de agua, al menos dos horas antes de su hora de llegada. • Tome todos los medicamentos para el corazón o la presión arterial la mañana de la prueba, con un sorbo de agua.

• Traiga consigo: lista actual de medicamentos, identificación con fotografía, tarjetas de seguro y los cuestionarios.

No podrá conducir después del procedimiento ni durante el resto del día. Por favor, pida a un adulto responsable que lo lleve a casa. Si necesita usar un taxi o un Uber, DEBE ir acompañado de un adulto responsable, como un familiar o un amigo, en el viaje de regreso.

Si su cita es a las 2:00 p. m. o más tarde, es necesario que su conductor permanezca en la sala de espera durante el procedimiento. No se pueden usar taxis ni Ubers para estas citas tardías. • Si toma anticoagulantes (aspirina, Coumadin,

Plavix, etc.), por favor, infórmenos. Nos pondremos en contacto con el médico que se los recetó para obtener instrucciones específicas.

• Si tiene un marcapasos o un desfibrilador, asegúrese de que la oficina esté al tanto. • Si tuvo COVID-19

en el mes anterior a su procedimiento, llame a la oficina. • Llame a la oficina si ha tenido nuevos síntomas, diagnósticos, medicamentos, cirugías u hospitalizaciones desde la última vez que hablamos con usted.

Fecha de cita: \_\_\_\_\_

Hora de llegada: \_\_\_\_\_

Tiempo de procedimiento \_\_\_\_\_

Por favor presentarse a: Syracuse

Endoscopy Associates **¡NUEVA UBICACIÓN!**

5000 Campuswood Drive #100 Este de  
Syracuse, NY 13057



**UNA SEMANA ANTES** de su cita,  
recibirá una llamada telefónica de la sala  
de endoscopia.  
**DEBE HABLAR CON ELLOS** o su  
procedimiento podría ser cancelado.  
El número de Jennifer es 234-6679

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Diabético CON INSULINA                                                        | Y N |
| SARM o ERV: ¿quién lo diagnosticó y cuándo?                                   | Y N |
| Se ordenó la prueba C-DIFF                                                    | Y N |
| Marcapasos/Desfibrilador - copia tarjeta marcapasos. ¿quién es el cardiólogo? | Y N |
| Anticoagulantes: ¿nombre y quién los prescribe el médico?                     | Y N |
| ¿Trastorno de la coagulación?                                                 | Y N |
| ¿Necesita traductor?                                                          | Y N |
| ¿Oxígeno? ¿Cuántos litros?                                                    | Y N |
| Hipertermia severa                                                            | Y N |
| En diálisis (debe ser RCC)                                                    | Y N |
| Tuvo COVID el mes pasado                                                      | Y N |
| El paciente tiene medicamentos para mantener                                  | Y N |

INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO



## Medicamentos que deben suspenderse antes del procedimiento:


### NO TOMAR 7 DÍAS ANTES:

Fentermina (Adipex-P, Suprenza)  
Fentermina/Topiramato (Qsymia)  
Orlistat (Xenical, Alli)  
Lorcaserina (Belviq)  
Dietilpropión  
Metanfetamina (Desoxyn)  
Liraglutida (Saxenda)  
Benzfetamina (Didrex, Regimex)  
Fendimetrazina (Bontril PDM)  
Carafate  
Hierro  
Multivitaminas  
Medicamentos a base de hierbas  
aceite de pescado  
Vitaminas A y E

### NO TOMAR 2 DÍAS ANTES:

Lisdexanfetamina (Vyvanse)  
Dextroanfetamina y anfetamina (Adderall)  
Cualquier medicamento para el TDAH  
Sildenafil (Viagra)  
Cialis

No se permite marihuana ni drogas recreativas



Si usted es un paciente diabético, llame al médico que controla su diabetes y hágale saber que se estará preparando para una colonoscopia.

Infórmeles sobre los cambios de medicación que necesita realizar y trabaje con su médico sobre cómo controlar su nivel de azúcar en sangre durante el período de preparación.

## MEDICAMENTOS PARA LA DIABÉTICA Y LA PÉRDIDA DE PESO

Los siguientes medicamentos **DEBEN SUSPENDERSE** según las instrucciones a continuación

### MEDICAMENTOS GLP-1

- Si está tomando un medicamento GLP-1 **DIARIAMENTE**, deberá omitir su dosis el día del procedimiento.
- Si está tomando un medicamento GLP-1 **SEMANALMENTE**, deberá omitir su dosis la semana anterior al procedimiento.

Trulicity (dulaglutida)  
Bydureon BCise o Byetta (Exenatida)  
Ozempic, Wegovy o Rybelsus (semaglutida)  
Saxenda o Victoza (Liraglutida)  
Adlyxin o Lyxumia (Lixisenatida)  
Mounjaro o Zepbound (Tirzepatide)  
Soliqua (insulina glargina/lixisenatida)  
Beinaglutida  
PEG-loxenatida

### MEDICAMENTOS SGLT2

- Suspenda estos medicamentos durante 3 días.

Jardiance (Empagliflozina)  
Brenzavvy (bexagliflozina)  
Invokana (Canagliflozina)  
Farxiga o Xigduo (dapagliflozina)  
Inpefa (sotagliflozina)  
Suglat (ipragliflozina)  
Invokamet (Canagliflozina más metformina HCl)  
Synjardy (Empagliflozina más metformina HCl)  
Qtern (dapagliflozina y saxagliptina)

Steglatro (Ertugliflozina) • Suspenda este medicamento durante 4 días