



# SYRACUSE ENDOSCOPY ASSOCIATES, LLC

739 IRVING AVE, SUITE 420, SYRACUSE, NY 13210

WWW.SYRACUSEGASTRO.COM

(315) 234-6677

## INSTRUCCIONES PARA LA PANENDOSCOPIA

(IMPORTANTE: asegúrese de leer también la parte posterior de este documento).

1. Ocho (8) horas antes de su hora de llegada: NO alimentos sólidos. NO leche ni productos lácteos. SIN tintes rojos o morados. NO café. NO bebidas alcohólicas ni cerveza. Puedes continuar con los líquidos claros por cuatro (4) horas más.
2. Cuatro (4) horas antes de su hora de llegada: suspenda todos los líquidos claros. Sin masticar chicle, sin duro dulces y no mascar tabaco.
3. Tome sus medicamentos con un sorbo de agua, al menos dos horas antes de su hora de llegada.
4. Traiga consigo: lista de medicamentos actuales, identificación con fotografía, tarjetas de seguro y cuestionarios.

Se permiten líquidos claros hasta 4 horas antes de su hora de llegada: \_\_\_\_\_

- Agua
- Jugos de frutas claras (manzana, uva blanca, arándano blanco)
- Caldo
- Gelatina (ni roja ni morada)
- Refresco de gengibre
- Gatorade (ni rojo ni morado)
- Kool-Aid (ni rojo ni morado)
- Siete arriba
- Paletas heladas (ni rojas ni moradas)
- Té (sin leche)

Cita Fecha: \_\_\_\_\_

Hora de llegada: \_\_\_\_\_ tiempo del procedimiento \_\_\_\_\_

**Por favor informe a:**  
 Asociados de endoscopia de Siracusa,  
 739 Irving Ave, Suite 420  
 Centro médico CNY  
 Siracusa, Nueva York 13210

➔ Una semana antes de su cita, recibirá una llamada telefónica de la sala de endoscopia. DEBES HABLAR CON ELLOS o tu trámite podrá ser cancelado. El número de Jennifer es 234-6679.

USO EN OFICINA:	
Diabético	EN
MRSA - quién diagnóstico/ ¿cuando?	EN
ERV, ESBL	EN
Diferencial C activo	EN
Pacer/Defib: copia la tarjeta del marcapasos, quién es el cardiólogo	EN
Anticoagulantes : nombre y quién los prescribe	EN
¿Trastorno de la coagulación? Coags de tarea	EN
¿Se necesita traductor?	EN
¿Oxígeno? ¿Cuántos litros?	SN
Frío. hipertermia	EN
En diálisis (debe ser RCC)	EN
Tuvo COVID en los últimos 2 meses	SN

INFORMACIÓN IMPORTANTE EN EL REVERSO



## INSTRUCCIONES PARA EL CONTADOR DE PANENDOSCOPIA...

### Instrucciones generales:

- Si es diabético, comuníquese con el médico que controla su diabetes. Le darán instrucciones para ajustar sus medicamentos para la preparación. Informe a su médico que no comerá ni beberá nada después de medianoche.
- Medicamentos GLP-1: Trulicity (Dulaglutida), Bydureon BCise (Exenatida), Ozempic (Semaglutida), Wegovy (Semaglutida), Byetta (Exenatida), Saxenda (Liraglutida), Victoza (Liraglutida), Adlyxin (Lixisenatida) y Rybelsus (Semaglutida).

Si está tomando un medicamento GLP-1 a diario, deberá omitir su dosis el día del procedimiento. Si está tomando un medicamento GLP-1 semanalmente, deberá omitir su dosis la semana anterior al procedimiento.

- Tome todos los medicamentos para el corazón o la presión arterial la mañana del examen, con un sorbo de agua. NO tome ningún diurético (pastillas para eliminar el agua). Ejemplos: Furosemida (Lasix), Hidroclorotiazida (HCTZ), Diuril, Aldactone.....
- Si toma anticoagulantes (aspirina, Coumadin, Plavix, etc.), asegúrese de que lo sepamos. Nos comunicaremos con su médico recetante para obtener instrucciones específicas.
- No tome fentermina 7 días antes. (pastillas para adelgazar como Adipex-P, Lomaira, Qsymia, etc.)
- Dos (2) días antes no tome Viagra (Sildenafil), Cialis (Tadalafil) ni ningún medicamento para la erección disfunción
- Dos (2) días antes de su procedimiento, no consumir drogas recreativas (marihuana, etc...)
- Si ha tenido COVID en los 2 meses anteriores a su procedimiento, infórmeselo al consultorio antes tu cita
- No se le permitirá conducir después de su procedimiento O durante el resto del día. Por favor haga arreglos para que un adulto responsable lo lleve a casa. Si es necesario que use un Taxi o Uber, DEBE tener un adulto responsable, como un familiar o amigo, que lo acompañe en el camino a casa.